

Afrykański pomór świń to choroba wirusowa, na którą chorują świnie domowe oraz dziki.

Najczęstsze objawy to:

- ♦ wysoka gorączka przy początkowo zachowanym apetycie i normalnym zachowaniu świń,
- ♦ padnięcia,
- ♦ sinica oraz drobne i liczne wybroczyny w skórze uszu, brzucha, na bokach ciała,
- ♦ krwiste wypływy z nosa, duszność,
- ♦ biegunka, często z domieszką krwi.

Najczęściej za wprowadzenie wirusa ASF do stada świń odpowiedzialny jest człowiek oraz lekceważenie przez hodowców trzody chlewnej zasad bioasekuracji.

Przyczyny zakażenia świń wirusem ASF:

- ♦ zanieczyszczone obuwie, ubranie, ręce osób mających kontakt z trzodą chlewną,
- ♦ zanieczyszczone środki transportu i maszyny rolnicze,
- ♦ wprowadzanie do chlewni, zakupionych zakażonych świń,
- ♦ kontakt świń z zakażonymi dzikami na skutek braku ogrodzenia gospodarstwa,
- ♦ zakażone odpadki żywnościowe, zlewki kuchenne oraz wyroby mięsne zakupione z nieznanego źródła i wniesione na teren chlewni, zwłaszcza dziczyzna i wyroby z dziczyzny,

- ♦ wałęsające się po lesie i wychodzące poza teren gospodarstwa psy i koty,
- ♦ zanieczyszczona słoma i siano,
- ♦ odwiedzanie gospodarstw przez osoby, zakażona pasza, woda, sprzęt gospodarski - szczególnie na terenach, gdzie jest duże zagęszczenie gospodarstw, w których hoduje się świnie.

Najważniejszym sposobem ochrony świń przed tą chorobą jest bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji, m.in.:

- ♦ zakaz kupowania świń nieoznakowanych, z niewiadomego źródła, bez świadectw zdrowia, wykazujących jakiegokolwiek objawy choroby
- ♦ utrzymywanie świń w sposób wykluczający ich kontakt z dzikami,
- ♦ karmienie i pojenie świń wyłącznie paszą i wodą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących,
- ♦ używanie oddzielnego stroju i obuwia do pracy ze zwierzętami i pozostawianie go w chlewni,
- ♦ dbanie o czystość w gospodarstwie, zwłaszcza sprzętu i narzędzi do obsługi zwierząt,
- ♦ wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,

- ♦ ograniczenie dostępu osobom postronnym do miejsc, gdzie przebywają świnie.

Zasady przemieszczania świń na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem ogniska ASF

♦ Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest **w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym**, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody), **obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania świń** z tego gospodarstwa przez okres:

- ♦ 40 dni w obszarze zapowietrzonym
- ♦ 30 dni w obszarze zagrożonym
- ♦ Po tym czasie należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa.
- ♦ szczegółowe informacje o możliwości przemieszczania świń z gospodarstw położonych na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii.