



Łęczna, dnia 9 czerwca 2022 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W ŁĘCZNEJ

Jarosław Bliźniuk

Wg rozdzielnika

Nasz znak: Zak.4512.1.1.77.2022

Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

W związku z niepokojącą sytuacją epizootyczną dotyczącą potwierdzenia wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa lubelskiego oraz stwierdzeniem pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie w Polsce. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej informuje o konieczności wzmocnienia bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnię na terenie powiatu łęczyńskiego.

W załączeniu przekazuje ulotki informacyjne dotyczące afrykańskiego pomoru świń w tym bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnię.

Proszę o udostępnienie ww ulotek w sposób zwyczajowo przyjęty tak aby jak największa liczba hodowców trzody chlewnej mogła zapoznać się z ww ulotkami.

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Łęcznej
2. Urząd Gminy w Cycowie
3. Urząd Gminy w Ludwinie
4. Urząd Miejski w Łęcznej
5. Urząd Gminy w Milejowie
6. Urząd Gminy w Puchaczowie
7. Urząd Gminy w Spiczynie
8. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łęcznej
9. ULW z terenu powiatu łęczyńskiego.
- 10.a.a

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łęcznej
Jarosław Bliźniuk



Powiatowy Inspektorat Weterynarii Al. Jana Pawła II 95, 21-010
Łęczna

tel.: (81) 752-31-19, fax: (81) 752-31-19, e-mail: leczna.piw@wiw.lublin.pl, www.piwleczna.pl

UWAGA ! ASF

ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

Zwierzęta i gospodarstwo
muszą być zarejestrowane
w bazie ARiMR

Zabezpiecz świnie przed
kontaktem z dzikami

Nie karm świn
odpadami kuchennymi

Do pracy ze zwierzętami
używaj oddzielnego stroju
i pozostawiaj go w chlewni

Do pomieszczeń ze zwierzętami
może wchodzić tylko właściciel
gospodarstwa lub osoba sprawująca
opiekę nad zwierzętami

Pamiętaj o utrzymaniu
pomieszczeń w czystości
oraz dezynfekcji

Maty nasączone środkiem
dezynfekcyjnym muszą być
włożone przed wejściem do
budynków inwentarskich

Obserwuj stan zdrowia świn -
o wszelkich niepokojących
objawach natychmiast powiadom
lekarza weterynarii



APEL

do hodowców trzody chlewnej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnię w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnię.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.




SZANOWNI PAŃSTWO, HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk **AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)** w kraju Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania **ZASAD BIOASEKURACJI** w gospodarstwach utrzymujących świnie, w tym o konieczności:

1. PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU ZWIERZĄT

(czyszczenie na sucho, mycie detergentem i płukanie wysokociśnieniowe, dezynfekcja powierzchni zewnętrznych pojazdów, dezynfekcja kabiny)




2. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKЦИИ OBUWIA



3. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKЦИИ POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO

(czyszczenie na sucho, mokro, dezynfekcja powierzchni w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, bioasekuracja granic gospodarstwa oraz dotycząca personelu),



4. PRZESTRZEGANIA ZASAD PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKЦИИ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ LISTĄ.

DOSTĘPNE PRODUKTY BIOBÓJCZE DO STOSOWANIA W CELU NISZCZENIA WIRUSA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF). STAN NA DZIEŃ: 9 MARCA 2018 R.:

AGRISAN 8090

- **POSTAĆ:** proszek przeznaczony do utrzymania higieny w miejscach hodowli i przetrzymywania i transportu zwierząt oraz do dezynfekcji budynków inwentarskich;
- **OPAKOWANIE:** worek papierowy/propylenowy;
- **SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO:** preparat stosujemy zarówno na legowiskach prosiąt i macior jak i w pomieszczeniach gdzie odbywa się tucz trzody. Przy stosowaniu AGRISANU należy zwrócić szczególną uwagę w na najbardziej zawilgocone części kojca: miejsca oddawania odchodów, pobierania paszy i wody. Produkt może być stosowany także na głęboką ściółkę. Preparat nanosi się na dezynfekowaną powierzchnię lub na ściółkę 1-2 razy w tygodniu przez równomierne posypywanie. Optymalna dawka to 50-100 g/1 m². Służy do dezynfekcji budynków inwentarskich w obecności zwierząt;

VIRKON™ S

- **POSTAĆ:** proszek, produkt o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym, przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, powierzchni, narzędzi i wyposażenia gospodarstwa, dezynfekcji środków transportu;
- **OPAKOWANIE:** saszetka w opakowaniu zbiorczym: pudełko (karton); butla w opakowaniu zbiorczym: pudełko (karton); wiadro (polipropylen);
- **SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO:** Skuteczny na powierzchniach porowatych, w niskich (od +4°C) temperaturach, w niskich stężeniach, krótkim czasie oddziaływania na patogen (10 min.). Rutynowa dezynfekcja wszystkich powierzchni: 1:100 (10 gramów środka Virkon™ S na każdy litr wody) przy użyciu myjki ciśnieniowej lub innego opryskiwacza mechanicznego nanieść roztwór środka Virkon™ S w dawce 300 ml/m².
Przygotowanie 1% roztworu: 150 g preparatu wraz z 15 l letniej wody wystarczy na 50 m²; 300 g preparatu wraz z 30 l letniej wody wystarczy na 100 m²; 1,5 kg preparatu wraz z 150 l letniej wody wystarczy na 500 m²;
Dezynfekcja obuwia i kół pojazdów: wlać roztwór do odpowiedniego pojemnika. Wymienić, gdy jest zanieczyszczony lub po upływie 4-5 dni od przygotowania. Stosować ciągle. Zaleca się przy każdym wjeździe i wejściu na farmę produkcyjną i przy wejściu do budynków.
Zamgławianie/dezynfekcja za pomocą spryskiwania: stosować urządzenie ciśnieniowe lub spryskiwacz plecakowy. Dozować 1 l roztworu na 10 m² powierzchni podłogi. Zamgławianie na zimno: przy użyciu zamgławiacza mechanicznego dozować 1 l roztworu preparatu na 10 m² powierzchni podłóg;

DESAM EFEKT M

- **POSTAĆ:** Ciecz, środek myjąco-dezynfekujący o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych, prątkobójczych oraz wirusobójczych, przeznaczony do stosowania do wszystkich zmywalnych powierzchni, sprzętu w zakładach opieki zdrowotnej, w przemyśle spożywczym;
- **OPAKOWANIE:** butelka (polietylen), kanister (polietylen);
- **SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO:** Środek skoncentrowany, stosowany w rutynowej dezynfekcji w stężeniu 0,25% przez 15 min., przy dezynfekcji powierzchni o wysokim ryzyku w stężeniu 0,5% przez 30 min. W celu przygotowania roztworu preparat należy rozcieńczyć wodą w temperaturze 20-35°C. Roztwór 0,25% przygotować poprzez uzupełnienie 2,5 ml koncentratu wodą do 998 ml. Silnie zabrudzone powierzchnie i przyrządy należy wstępnie oczyścić mechanicznie a następnie zdezynfekować.



ZATRZYMAJ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.

Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się.

Czyść odzież i buty

Zdezynfekuj sprzęt

Nie dopuszczaj do kontaktu swoich świń z dzikami

Pozyskuj świnię i paszę z godnych zaufania gospodarstw

Zgłaszaj wszystkie podejrzone przypadki
swojemu lekarzowi weterynarii.



www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/ #StopASF



Co to jest Afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (ASF) to śmiertelna choroba dotykająca świnie domowe i dziki.

Chociaż wirus ASF **nie jest groźny dla ludzi**, może poważnie **zaszkodzić naszemu** przemysłowi hodowli **trzody chlewnej**.

W okresie od 2016 r. do czerwca 2020 r. z powodu ASF **padło** w Europie **1,3 mln świń**.

Obecnie na ASF **nie ma ani szczepionki**, ani lekarstwa.

Podstawową strategią w walce z tą wyniszczającą chorobą jest **zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie**.

AFS przenosi się przez



▶ Kontakt bezpośredni pomiędzy zarażonymi świniami lub dzikami



▶ Kontakt pośredni poprzez spożycie skażonej żywności, np. odpadów żywnościowych, paszy lub ściemi



▶ Ukąszenia przez zainfekowane kleszcze



▶ Kontakt ze skażonym sprzętem, np. odzieżą, sprzętem rolniczym i pojazdami

Lista kontrolna dotycząca ASF dla hodowcy świń

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się



- ▶ Czyść odzież i buty
- ▶ Zdezynfekuj sprzęt
- ▶ Nie dopuszczaj do kontaktu swoich świń z dzikami

Wykrywanie objawów



- ▶ Gorączka
- ▶ Utrata apetytu lub wagi
- ▶ Utrata energii
- ▶ Wymioty
- ▶ Biegunka
- ▶ Zaczerwienienia (wybroczynowość) skóry

Zgłaszanie



W przypadku podejrzenia zakażenia ASF skontaktuj się z miejscowym lekarzem weterynarii.

#Stop ASF

www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/

Godna zaufania nauka dla bezpiecznej żywności

ZATRZYMAJ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.

Ochrona naszych świń przed ASF

Afrykański pomór świń (ASF) to śmiertelna choroba dotykająca świnie domowe i dziki, na którą nie ma szczepionki ani lekarstwa. Chociaż ASF nie jest groźny dla ludzi, może poważnie zaszkodzić hodowli świń. Wybuchy ognisk ASF stanowią poważne zagrożenie dla hodowli świń. Wspólnie, poprzez **wykrywanie, zapobieganie i zgłaszanie**, możemy powstrzymać jego rozprzestrzenianie się i chronić nasze świnie.

Zapobieganie



Zatrzymaj rozprzestrzenianie się – chroń swoje świnie przed ASF

- ▶ Zmieniaj buty i ubrania wchodząc do chlewni
- ▶ Dezynfekuj sprzęt
- ▶ Zabezpiecz gospodarstwo przed dostępem dzików
- ▶ Używaj paszy dobrej jakości
- ▶ Pozyskuj świnie z godnych zaufania gospodarstw

Wykrywanie



Poznaj swoje świnie – poznaj oznaki ASF

Dzięki regularnym kontrolom dowiesz się, czy Twoje świnie źle się czują. Każdy z tych objawów jest powodem do niepokoju.

Nie czekaj. **Skontaktuj się z lokalnym lekarzem weterynarii.**

- ▶ Gorączka
- ▶ Utrata apetytu/wagi
- ▶ Utrata energii
- ▶ Wymioty
- ▶ Biegunka
- ▶ Zaczerwienienia (wybroczynowość) skóry
- ▶ Krwawienie

Zgłaszanie



Nie wahaj się

Zgłaszaj wszystkie podejrzane przypadki swojemu lekarzowi weterynarii. To może być ASF.

Od 2014 roku
**13 państw
członkowskich
UE zostało
dotkniętych ASF**

**To są kraje gdzie
wystąpiły ogniska
epidemii w 2021 r.**, chociaż
sytuacja stale się zmienia

ASF w
Unii Europejskiej
**Od 2014 roku
ogniska ASF
wykryto w
13
krajach***
Źródło: ADIS wyodrębnione
na: 27/06/2021

Grecja



-

Belgia, Czechy,
Niemcy, Węgry



Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa,
Niemcy, Węgry, Włochy

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska,
Rumunia, Słowacja, Włochy



Polska, Rumunia i Słowacja

**Niektóre kraje od tego czasu nie
doświadczyły żadnych nowych
ognisk ASF na swoim obszarze.**

* EFSA jest kluczowym organem w zakresie zarządzania ryzykiem w obszarze żywności i pasz. We współpracy z władzami krajowymi oraz w wyniku otwartych konsultacji z zainteresowanymi stronami, EFSA zapewnia niezależne doradztwo naukowe i przejrzystą komunikację na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń.

ISBN 978-92-9499-330-4 | doi:10.2805/36405 | TM-06-21-015-PL-N

#Stop ASF

Godna zaufania nauka dla bezpiecznej żywności