



CO TO JEST?

Afrykański pomór świń (*African Swine Fever - ASF*) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji. Zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

DROGI ZAKAŻENIA

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy). Innymi czynnikami mogą być: skażona pasza, woda oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.

JAK ROZPOZNAĆ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ?

Objawy afrykańskiego pomoru świń mogą być niespecyficzne, podobne do innych chorób lub zatruc, mogą być różne w różnych stadach (więcej informacji o chorobie można znaleźć w materiałach OIE). Następujące objawy zawsze powinny zaniepokoić hodowcę:

- nagłe padnięcia świń - ASF w stadzie świń może niekiedy objawić się jedynie nagłymi padnięciami, bez innych objawów towarzyszących;
- wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała (do 40,5-42°C), któremu mogą nie towarzyszyć inne symptomy (gorączkujące świnie mają czasem zachowany apetyt, poruszają się na ogół normalnie);
- sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,
- drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze oraz zaczerwienienie skóry widoczne zwłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach,
- duszność, pienisty wydech z nosa, wydech z worka spojówkowego,
- biegunka - często z domieszką krwi,
- objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych, niedowład zadu,

PODEJRZEWASZ WYSTĄPIENIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ?

- niezwłocznie zgłoś wystąpienie ww. objawów i/lub nagłych licznych padnięć świń – bezpośrednio miejscowemu powiatowemu lekarzowi weterynarii lub za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, starosty);
- nie wywóz z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy, sprzętu;
- ogranicz dostęp osób postronnych do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ?

- ❖ Kupuj świnie wyłącznie z zarejestrowanych stad oraz zaopatrzone w urzędowe świadectwo zdrowia;
- ❖ Izoluj świnie w sposób wykluczający kontakt z innymi zwierzętami oraz osobami postronnymi. Zabezpiecz drzwi i okna budynków inwentarskich przed dostępem gryzoni, i innych zwierząt domowych i wolno żyjących;
- ❖ Karm świnie paszą pochodzącą ze znanych źródeł, zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
- ❖ Stosuj minimum 30-dniową kwarantannę dla surowców paszowych pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami;
- ❖ Zmieniaj odzież i obuwie przy **każdym** wejściu do pomieszczeń, w których utrzymujesz świnie;
- ❖ **Przed każdym wejściem do chlewni myj i odkażaj ręce oraz obuwie;**
- ❖ Regularnie oczyszczaj i dezynfekuj sprzęt przeznaczony do obsługi świń
- ❖ Stosuj minimum 90-dniową kwarantannę dla surowców wykorzystywanych jako ściółka dla świń;
- ❖ Unikaj udziału w polowaniach, zbieraniu runa leśnego oraz innych czynności wymagających bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem potencjalnie zanieczyszczonym wirusem ASF (lasy, łąki, miejsca z widocznymi śladami bytowania dzików);
- ❖ Zabezpiecz **wszystkie** wjazdy (maty dezynfekcyjne/ niecki dezynfekcyjne/ bramy dezynfekcyjne) oraz **wszystkie** wejścia do gospodarstwa i wejścia do chlewni (maty dezynfekcyjne),
- ❖ Przestrzegaj zakazu wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, ich części, trofeów, sprzętu i materiałów, które mogły zostać skażone wirusem ASF;
- ❖ Unikaj wpuszczania na teren gospodarstwa pojazdów zakładów utylizacyjnych oraz innych pojazdów, a także maszyn rolniczych, które mogą przenosić wirusa ASF;
- ❖ W miarę możliwości wyznacz w gospodarstwie strefy czyste, zamknięte dla osób postronnych i pojazdów nie związanych z obsługą świń, oraz strefy brudne;
- ❖ Stosuj ogrodzenia stanowiące barierę oddzielającą gospodarstwo od zwierząt wolnożyjących i osób postronnych;
- ❖ Dokonuj regularnych przeglądów zabezpieczeń epizootycznych gospodarstwa takich jak: maty dezynfekcyjne, urządzenia do dezynfekcji, siatki w oknach, ogrodzenia, i utrzymuj je w dobrym stanie technicznym, zapewniającym skuteczne działanie.

W PRZYPADKU ODNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA:

- nie należy zwłok dotykać czy przenosić;
- należy niezwłocznie powiadomić właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
- nie wchodzić do miejsca utrzymywania świń przez co najmniej 72 godziny.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna
Tel. 81 752 31 19